

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	027	CODE	004012001027
診療科	内科	医師	堤
セット名称	☆IVAC		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	60 mg/m ²
イホマイド	DIV	1500 mg/m ²
シタラビン	DIV	2000 mg/m ²
シタラビン	DIV	2000 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
2	イホマイド()mg+生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了すること	3時間 DIV		●	●	●	●	●																						
3	ウロミテキサン()mg+生食50mL 手技: 静脈内 経路: イホマイドの開始と同時に	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
4	エトポシド()mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路: イホマイドの後に	2時間 DIV		●	●	●	●	●																						
5	ウロミテキサン()mg+生食50mL 手技: 静脈内 経路: イホマイドの開始4時間後	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
6	シタラビン()mg+5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: エトポシドの後に	3時間 DIV		●	●																									
7	ウロミテキサン()mg+生食50mL 手技: 静脈内 経路: 2の開始8時間後	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
8	シタラビン()mg+5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: (AMの)シタラビンの12時間	3時間 DIV		●	●																									
9	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●																						
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: 終了後	IV																												