

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	032	CODE	004012001032
診療科	内科	医師	堤
セット名称	HyperCVAD		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	300 mg/m ²
ドキシソビシン	DIV	25 mg/m ²
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.4 mg/m ²
エンドキサン	DIV	300 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: AM分	30分 DIV		●	●	●	●	●																																							
2	生食100mL+デキサート33mg 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●	●																																								
3	生食250mL+エンドキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する	2時間 DIV		●	●	●	※12時間間隔で(AM分)																																								
4	生食50mL+オンコビン()mg 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV						●																																							
5	生食100mL+ドキシソビシン()mg 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV						●	●																																						
6	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分	30分 DIV		●	●	●																																									
7	生食250mL+エンドキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する	2時間 DIV		●	●	●	※12時間間隔で(PM分)																																								
8	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●	●	●																																									
9	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV						●	●																																						
10	手技: 経路:																																														