

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	033	CODE	004012001033
診療科	内科	医師	堤
セット名称	MA		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	200 mg/m ²
メソトレキセート	DIV	800 mg/m ²
シタラビン(AM分)	DIV	3000 mg/m ²
シタラビン(PM分)	DIV	3000 mg/m ²
ロイコボリン	IV	15 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: AM分	30分 DIV		●	●	●																									
2	生食250mL+メソトレキセート()mg 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●																											
3	生食500mL+メソトレキセート()mg 手技: 静脈内 経路: 1時間投与のMTXに続けて	23時間 DIV		●																											
4	5%ブドウ糖250mL+シタラビン()mg 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔で(AM分)	3時間 DIV			●	●																									
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分	30分 DIV			●	●																									
6	5%ブドウ糖250mL+シタラビン()mg 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔で(PM分)	3時間 DIV			●	●																									
7	ソルデム3A 1000mL +ソルデム1 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●																									
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV					●																								
9	ロイコボリン ()mg 手技: 静脈内 経路: 6開始36時間後から6時間毎	IV			①	④	③																								
10																															