

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	034	CODE	004012001034
診療科	内科	医師	堤
セット名称	MA(modified)		
申請年月日	平成22年6月22日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	3500 mg/m ²
シタラビン(AM分)	DIV	2000 mg/m ²
シタラビン(PM分)	DIV	2000 mg/m ²
ロイコボリン	IV	15 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: AM分	30分 DIV		●	●																										
2	生食250mL+メソトレキセート()mg 手技: 静脈内 経路:	3時間 DIV		●																											
3	5%ブドウ糖250mL+シタラビン()mg 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔で(AM分)	3時間 DIV			●																										
4	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分	30分 DIV				●																									
5	5%ブドウ糖250mL+シタラビン()mg 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔で(PM分)	3時間 DIV				●																									
6	ソルデム3A 1000mL +ソルデム1 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●																										
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV					●																								
8	ロイコボリン()mg (MTX開始36hr後から6hr間隔で8回) 手技: 静脈内 初回のみ50mg/body	IV			①	④	③																								
9																															
10	手技: 経路:																														