

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	043	CODE	004012001043
診療科	内科	医師	堤
セット名称	MACOPP-B		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	100 mg/m ²
メソトレキセート	DIV	300 mg/m ²
ドキシソルビシン	DIV	50 mg/m ²
エンドキサン	DIV	350 mg/m ²
オンコビン	DIV	1.4 mg/m ²
プレドニン	経口	50 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師
プレオ		DIV	10	mg/m ²	
ロイコボリン		IV	15	mg/body	

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロン点滴バック 1バック 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
2	ドキシソルビシン()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
3	エンドキサン()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後6時間以内に投与終了する	3時間 DIV		●																											
4	メソトレキセート()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路: 最初の1時間100mg/m ² で	1時間 DIV																													
5	メソトレキセート()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 残り4時間300mg/m ² で	4時間 DIV																													
6	オンコビン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV																													
7	プレオ()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV																													
8	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																											
9	プレドニン錠5mg()錠 (朝 -昼 -夕 錠服用) 手技: 経路:	食後 p.o		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	ロイコボリン15mg MTX開始36時間後から6時間毎に8回 手技: 静脈内 経路:	IV																													

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	043	CODE	004012001043
診療科	内科	医師	堤
セット名称	MACOPP-B		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	100 mg/m ²
メソトレキセート	DIV	300 mg/m ²
ドキシソルビシン	DIV	50 mg/m ²
エンドキサン	DIV	350 mg/m ²
オンコビン	DIV	1.4 mg/m ²
プレドニン	経口	50 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師
プレオ		DIV	10	mg/m ²	
ロイコボリン		IV	15	mg/body	

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
11	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV	●								●													●							
12	ドキシソルビシン()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV	●																												
13	エンドキサン()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV	●																												
14	メソトレキセート()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路: 最初の1時間100mg/m ² で	1時間 DIV																													
15	メソトレキセート()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 残り4時間300mg/m ² で	4時間 DIV																													
16	オンコビン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV																													
17	プレオ()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV																													
18	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV	●																												
19	プレドニン錠5mg()錠 (朝 -昼 -夕 錠服用) 手技: 経路:	食後 p.o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	ロイコボリン15mg MTX開始36時間後から6時間毎に8回 手技: 静脈内 経路:	IV																													

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	043	CODE	004012001043
診療科	内科	医師	堤
セット名称	MACOPP-B		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	100 mg/m ²
メソトレキセート	DIV	300 mg/m ²
ドキシソルビシン	DIV	50 mg/m ²
エンドキサン	DIV	350 mg/m ²
オンコビン	DIV	1.4 mg/m ²
プレドニン	経口	50 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師
プレオ		DIV	10	mg/m ²	
ロイコボリン		IV	15	mg/body	

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
21	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV	●																											
22	ドキシソルビシン()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV	●																											
23	エンドキサン()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路:	3時間 DIV	●																											
24	メソトレキセート()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:最初の1時間100mg/m ² で	1時間 DIV																												
25	メソトレキセート()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路:残り4時間300mg/m ² で	4時間 DIV																												
26	オンコビン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV																												
27	ブレオ()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV																												
28	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV	●																											
29	プレドニン錠5mg()錠 (朝 -昼 -夕 錠服用) 手技: 経路:	食後 p.o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
30	ロイコボリン15mg MTX開始36時間後から6時間毎に8回 手技: 静脈内 経路:	IV																												