

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	044	CODE	004012001044
診療科	内科	医師	堤
セット名称	☆MINE		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イホマイド	DIV	1330 mg/body
ノバントロン	DIV	8 mg/m ²
エトポシド	DIV	65 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●																									
2	イホマイド()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了すること	1時間 DIV		●	●	●																									
3	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始と同時に	30分 DIV		●	●	●																									
4	ノバントロン()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
5	エトポシド()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●																									
6	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始の4時間後	30分 DIV		●	●	●																									
7	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始の8時間後	30分 DIV		●	●	●																									
8	ソルデム3A 1500mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●																									
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV																													
10	手技: 経路:																														