

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	045	CODE	004012001045
診療科	内科	医師	堤
セット名称	TEOP		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急	通常		●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ピノルビン	DIV	30 mg/m ²
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1 mg/m ²
ベプシド	p.o	50 mg/body
プレドニン	p.o	30 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ベプシド50mg 手技: 経路:	食後 p.o		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	プレドニン錠5mg(6)錠(朝 -昼 -夕 錠服用) 手技: 経路:	食後 p.o		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	プレドニン錠5mg(4)錠(朝 -昼 -夕 錠服用) 手技: 経路:	食後 p.o		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	プレドニン錠5mg(2)錠(朝 -昼 -夕 錠服用) 手技: 経路:	食後 p.o		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
6	5%ブドウ糖100mL+ピノルビン()mg 手技: 静脈内 経路: 希釈後6時間以内に投与終了すること	1時間 DIV		●																											
7	生食50mL+オンコビン()mg 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
8	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																											
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																											
10	手技: 経路:																														