# 化学療法レジメンセット登録用紙



| 領域 | 血液腫瘍 | ルート | リザーバー |
|---|---|---|---|
| 適応 | 【NHL】非ホジキンリンパ腫 | | |
| No（3桁） | 046 | CODE | 004012001046 |
| 診療科 | 内科 | 医師 | 堤 |
| セット名称 | MECP | | |
| 申請年月日 | 平成21年7月7日 | | |
| 緊急 | | 通常 | ● |

| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
|---|---|---|
| カルボプラチン | DIV | 300 mg/㎡ |
| ベプシド | p.o | 140 mg/㎡ |
| ノバントロン | DIV | 8 mg/㎡ |
| プレドニン | p.o | 40 mg/㎡ |
| | | |
| | | |

| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| | ● | | | | |

投与スケジュール：（　投　休）or（Interval日数　日）《　》クール

| 投与順 | Rp | 投与時間 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベプシド（　）mg　（朝　-夕　mg服用<br>手技：　経路： | 食後<br>p,o | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 2 | プレドニン錠5mg（　）錠(朝　-昼　-夕　錠服用<br>手技：　経路： | 食後<br>p,o | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 3 | グラニセトロンバック　50mL<br>手技：静脈内　経路： | 30分<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 4 | 生食100mL+ノバントロン（　）mg<br>手技：静脈内　経路： | 30分<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 5 | 生食250mL+カルボプラチン（　）mg<br>手技：静脈内　経路： | 2時間<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 6 | ソルデム3A　1000mL<br>手技：静脈内　経路： | 6時間<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 7 | ヘパリンNaロックシリンジ　1本<br>手技：静脈内　経路： | IV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 8 | 手技：　経路： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 手技：　経路： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 手技：　経路： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

レジメ検討委員会