

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	062	CODE	004012001062
診療科	血液内科	医師	堤
セット名称	SMILE		
申請年月日	平成24年3月8日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	2000 mg/m ²
ロイコボリン	IV	15*4 mg/body
イホマイド	DIV	1500 mg/m ²
ウロミテキサン	DIV	300 mg/m ²
デキサート	DIV	33 mg/body
エトポシド	DIV	100 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	6000 単位/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 28 日) 《 2 》クール

投与順	Rp	投与時間	Day																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ロイコボリン (15)mg 手技: 静脈内 経路: MTX開始36hr後から6hr毎	(4:00) IV				●	●																								
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV(9:30)		●																											
3	グラニセトロンバック 50mL + デキサート33mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV(9:30)			●	●	●																								
4	ソルデム3A 1000mL + ソルデム1 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 DIV(10:00)		●	●	●	●																								
5	メソトレキセート()mg + 生食500mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV(10:00)		●																											
6	イホマイド()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了すること	3時間 DIV(10:00)			●	●	●																								
7	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: IFOの開始時	30分 DIV(10:00)			●	●	●																								
8	ロイコボリン (15)mg 手技: 静脈内 経路: MTX開始36hr後から6hr毎	(10:00) IV				●	●																								
9	エトポシド()mg + 生食500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV(13:00)			●	●	●																								
10	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: IFOの開始から4時間後	30分 DIV(14:00)			●	●	●																								

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	062	CODE	004012001062
診療科	血液内科	医師	堤
セット名称	SMILE		
申請年月日	平成24年3月8日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	2000 mg/m ²
ロイコボリン	IV	15*4 mg/body
イホマイド	DIV	1500 mg/m ²
ウロミテキサン	DIV	300 mg/m ²
デキサート	DIV	33 mg/body
エトポシド	DIV	100 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	6000 単位/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 28 日) 《 2 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
11	ロイコボリン (15)mg 手技: 静脈内 経路: MTX開始36hr後から6hr毎	(16:00) IV				●	●																									
12	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: IFOの開始から8時間後	30分 DIV(18:00)			●	●	●																									
13	ロイコボリン (15)mg 手技: 静脈内 経路: MTX開始36hr後から6hr毎	(22:00) IV				●	●																									
14	ペミロックSy 1筒 手技: 静脈内 経路: 点滴前	IV									●	●	●	●	●	●	●															
15	生食20mL1A ①ロイナーゼ1Vを注射用水5mLで溶解 手技: 皮内 経路: 皮内反応テスト用	②①から0.1mLとりNsで1mLに希釈 ③②から0.1mLとり皮内反応液とする									●																					
16	ロイナーゼ()単位+注射用水+5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: フィルター付輸液セットを使用	2時間 DIV									●	●	●	●	●	●	●															
17	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路: 点滴後	IV						●			●	●	●	●	●	●	●															
18	手技: 経路:																															
19	手技: 経路:																															
20	手技: 経路:																															