

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	065	CODE	004012001065
診療科	内科	医師	堤
セット名称	VR-CAP【静注】		
申請年月日	平成27年10月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/m <sup>2</sup>
ベルケイド	IV	1.3 mg/m <sup>2</sup>
ドキシソルビシン	DIV	50 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	750 mg/m <sup>2</sup>
プレドニン	p.o	60 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ PSL 60mg/body Day1-5

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ネオマレルミンTR1錠+カロナール200mg4錠+レバミピド1 手技: 経路:リツキシマブの約30分前に	p.o		●																											
2	生理食塩水 50mL 手技: 経路:プライミング用			●																											
3	リツキシマブ( )mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路:前投薬の30分後に開始する	右記参照 DIV		●																											
4	ベルケイド( )mg 手技: 静脈内 経路:Ns3mLで溶解し、必要量とる	IV			●			●				●			●																
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●																										
6	生食100mL+ドキシソルビシン( )mg 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV			●																										
7	生食250mL+エンドキサン( )mg 手技: 静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV			●																										
8	プレドニン錠 毎食後(朝 錠-昼 錠-夕 錠) 手技: 経路:	p.o			●	●	●	●	●																						
9	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV			●																										
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1筒 手技: 静脈内 経路:終了時			●	●																										