

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	067	CODE	004012001067
診療科	内科	医師	堤
セット名称	HyperCVAD		
申請年月日	平成28年8月5日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	300 mg/m <sup>2</sup>
ピノルビン	DIV	25 mg/m <sup>2</sup>
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.4 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	300 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																								
2	生食100mL+デキサート33mg 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●	●							●	●	●	●															
3	生食250mL+エンドキサン( )mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了すること(AM分)	2時間 DIV		●	●	●																										
4	生食50mL+オンコビン( )mg 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV						●						●																		
5	5%Glu100mL+ピノルビン( )mg 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV						●	●																							
6	生食250mL+エンドキサン( )mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事(PM分)	2時間 DIV		●	●	●																										
7	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●	●	●																										
8	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●						●	●	●	●															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															