

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	071	CODE	004012001071
診療科	内科	医師	堤
セット名称	CAEBV cytoreduction(A)		
申請年月日	平成28年9月29日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	750 mg/m <sup>2</sup>
ピノルビン	DIV	25 mg/m <sup>2</sup>
オンコビン(MAX2mg)	DIV	2 mg/m <sup>2</sup>
プレドニン	内服	50 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンBG 1mg 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●																										
2	オンコビン( )mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
3	ピノルビン( )mg + 5%ブドウ糖 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●																										
4	エンドキサン( )mg + 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する	3時間 DIV		●																											
5	プレドニン錠( )mg 手技: 内服 経路:	内服		●	●	●	●	●																							
6	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																											
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:			●	●																										
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														