

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	075	CODE	004012001075
診療科	内科	医師	堤
セット名称	ESCAP		
申請年月日	平成30年1月10日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	150 mg/m ²
シタラビン(1日2回)	DIV	1500 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	6000 単位/m ²
ソル・メルコート(1日2回)	DIV	62.5 mg/m ²
プレドニン	DIV	30 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンBG 1mg 50mL 手技: 静脈内 経路: AM分	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
2	エトポシド()mg + 5%ブドウ糖500mL 手技: 静脈内 経路:	3時間 DIV		●																										
3	ソル・メルコート()mg + 生食 100mL 手技: 静脈内 経路: AM分	1時間 DIV			●	●	●	●																						
4	シタラビン()mg + 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔(AM分)	3時間 DIV			●	●	●	●																						
5	グラニセトロンBG 1mg 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分	30分 DIV		●	●	●	●																							
6	ソル・メルコート()mg + 生食 100mL 手技: 静脈内 経路: PM分	1時間 DIV		●	●	●	●																							
7	シタラビン()mg + 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔(PM分)	3時間 DIV		●	●	●	●																							
8	ロイナーゼ()mg + 注射用水 20mL + 5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: フィルター付キレート使用/AraC投与4時間後	2時間 DIV							●	●	●	●	●																	
9	プレドニン()mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV							●	●	●	●																		
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:			●	●	●	●	●	●	●	●	●																		