

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	082	CODE	004012001082
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Romidepsin		
申請年月日	平成31年3月20日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イストダックス	DIV	14 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 専用溶解用液2.2mLで溶解(5mg/mL)

※ 生食500mLへ希釈後24時間以内に使用

※ 専用溶解液で溶解後8時間以内で使用

投与スケジュール: (3 投 1 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●							●								●													
2	生食 500mL+ イストダックス ()mg 手技: 静脈内 経路: 専用溶解液2.2mLで溶解(5mg/mL)	4時間 DIV		●							●								●													
3	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●								●													
4	手技: 経路:																															
5	手技: 経路:																															
6	手技: 経路:																															
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															