

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	093	CODE	004012001093
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Pola+BR		
申請年月日	令和3年6月7日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/m <sup>2</sup>
ポライビー	DIV	1.8 mg/kg
トレアキシン	DIV	90 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 30mg/V:DW 1.8mLで溶解、140mg/V:DW 7.2mLで溶解(20mg/mL)

前投薬:クロルフェニラミン 1錠 +カロナール200mg 4錠 +レバミピド 1錠

※ ポライビー:希釈後最終濃度:0.72mg/mL~2.70mg/mLにする

投与スケジュール: ( 1 投 2 休 ) or (投与間隔 21 日)《 6 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/前投服用	IV		●																											
2	リツキシマブ ( )mg +生食500mL 手技: 静脈内 経路: 前投服用30分後/1mg/mLに希釈	4時間 DIV		●	初回投与時は投与速度調整																										
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/前投服用/インラインフィルター使用	IV			●																										
4	ポライビー( )mg + 注射用水 + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: DW溶解(20mg/mL)/前投服用30分後	90分 DIV			●	初回90分、2回目以降は30分可																									
5	グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●	●																									
6	トレアキシン ( )mg+ 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後6hr以内に終了する	1時間 DIV			●	●																									
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●																									
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														