

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	094	CODE	004012001094
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Pola+BR(2日間)		
申請年月日	令和3年6月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/m ²
ポライビー	DIV	1.8 mg/kg
トレアキシン	DIV	90 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 30mg/V:DW 1.8mLで溶解、140mg/V:DW 7.2mLで溶解(20mg/mL)

前投薬:クロルフェニラミン 1錠 +カロナール200mg 4錠 +レバミピド 1錠

※ ポライビー:希釈後最終濃度:0.72mg/mL~2.70mg/mLにする

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日)《 6 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																																																
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/前投服用	IV		●																																															
2	リツキシマブ ()mg +生食500mL 手技: 静脈内 経路: 前投服用30分後/1mg/mLに希釈	4時間 DIV		●	初回投与時は投与速度調整																																														
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: インラインフィルター使用	30分 DIV		●																																															
4	ポライビー()mg + 注射用水 + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: DW溶解(20mg/mL)	30分 DIV		●	2回目以降は30分可																																														
5	グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●																																														
6	トレアキシン ()mg+ 注射用水 +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後6hr以内に終了する	1時間 DIV		●	●																																														
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●																																														
8	手技: 経路:																																																		
9	手技: 経路:																																																		
10	手技: 経路:																																																		