

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	095	CODE	004012001095
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Remitro		
申請年月日	令和3年5月26日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
レミトロ	DIV	9 μ g/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

再発又は難知性の末梢性T細胞リンパ腫

前投薬: 投与30分前にアセトアミノフェン500mg+クロルフェニラミン6mg p.o、デキサート6.6mg div

再発又は難知性の皮膚T細胞性リンパ腫

3μ g/mL以上に希釈

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 8 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 20mL + デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																							
2	グラニセトンバッグ 1mg 手技: 静脈内 経路: 前投薬開始/インラインフィルター使用しない	30分 DIV		●	●	●	●	●																							
3	レミトロ( )μ g+ 注射用水+ 生食 100mL 手技: 静脈内 経路: 前投薬服用30分後より/注射用水2.1mLで溶解(150μ g/mL)	1時間 DIV		●	●	●	●	●																							
4	生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●	●	●	●	●																							
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●																							
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														