

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	026	CODE	004015001026
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【臨床研究MM14②PBSC採取】scBor+HdCY		
申請年月日	平成28年7月1日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ベルケイド	SC	1.3 mg/m ²
エンドキサン	DIV	1500 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※化学療法終了後、好中球数1000/ μ L未満になった日から、あるいは採取予定日5日前から、G-CSF 200~400 μ g/m²/day 1回または2分割の

連日皮下注射を開始し、末梢血幹細胞採取まで投与を続ける

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																															
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	ベルケイド()mg + 生食()mL 手技:皮下 経路:生食1.2mLで溶解する	SC		●																														
2	グラニセロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV																																
3	エンドキサン()mg + 生食500mL 手技:静脈内 経路:	3時間 DIV																																
4	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン開始時	30分 DIV																																
5	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン開始4時間後	30分 DIV																																
6	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン開始8時間後	30分 DIV																																
7	ソルデム3A 2000mL 手技: 経路:	24時間 CIV																																
8	手技: 経路:																																	
9	手技: 経路:																																	
10	手技: 経路:																																	