

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	027	CODE	004015001027
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【臨床研究MM14③PBSCT】scBor+HD-Mel		
申請年月日	平成28年7月1日		
緊急	通常		●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ベルケイド	SC	1.3 mg/m ²
アルケラン	DIV	100 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※PBSCT翌日よりG-CSF300μg/m²/dayを連日点滴静注し、白血球数1万/mm³以上まで続ける

※末梢血幹細胞採取終了後2ヶ月以内に治療を開始すること

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ベルケイド()mg + 生食()mL 手技:皮下 経路:生食1.2mLで溶解する	SC		●			●				●			●																		
2	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●	●																										
3	アルケラン()mg + 生食100mL 手技:静脈内 経路:1.5時間以内に投与終了すること	1時間 DIV			●	●																										
4	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路:	IV			●	●																										
5	PBSCT 手技: 経路:							●																								
6	手技: 経路:																															
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															