化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No（3桁）	045	CODE	004015001045
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	elotuzumab（1・2サイクル）		
申請年月日	平成29年1月19日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エムプリシティ	DIV	10 mg/kg
レブラミド	内服	25 mg/body
デカドロン	内服	28 mg/body
デキサート	DIV	8.25 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

※ 前投薬：ジフェンヒドラミン3T+ファモチジン1T+ブルフェン2T　※ 1mg/mLに希釈する

※ 30mL/hrで開始し、60mL→120mL/hrとする　※ インラインフィルター使用

投与スケジュール：（　投　休）or（投与間隔　28　日）《　》クール

投与順	Rp	投与時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デカドロン28mg 手技：内服　経路：Rp4投与前日(昼食後)に内服	内服	●							●							●							●							
2	生食　20mL+　デキサート6.6mg1V+　デキサート1.65mg1A 手技：静脈内　経路：Rp4開始45分前までにIV	IV		●							●							●							●						
3	生食　50mL 手技：　経路：インラインフィルター使用・前投薬投与	45分 DIV		●							●							●							●						
4	エムプリシティ（　）mg+注射用水40mL+　生食　500mL 手技：静脈内　経路：1VをDW13mLで溶解（25mg/mL）	※上記参照 DIV		●							●							●							●						
5	ヘパリンNaロックシリンジ 手技：静脈内　経路：終了後	IV		●							●							●							●						
6	レブラミド（　）mg 手技：内服　経路：3投1休	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
7	手技：　経路：																														
8	手技：　経路：																														
9	手技：　経路：																														
10	手技：　経路：																														

レジメ検討委員会