

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	047	CODE	004015001047
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	elotuzumab(1・2サイクル:DEXdiv)		
申請年月日	平成29年1月19日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エムプリシティ	DIV	10 mg/kg
レブラミド	内服	25 mg/body
デキサート	DIV	23.1 mg/body
デキサート	DIV	8.25 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 前投薬:ジフェンヒドラミン3T+ファモチジン1T+ブルフェン2T ※ 1mg/mLに希釈する

※ 30mL/hrで開始し、60mL→120mL/hrとする ※ インラインフィルター使用

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 28 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食 50mL+ デキサート 6.6mg3V+ デキサート 16.5mg2A 手技:静脈内 経路:Rp4投与前日(昼食後)にDIV(DEX28mg内服分)	15分 DIV	●									●												●								
2	生食 20mL+ デキサート6.6mg1V+ デキサート1.65mg1A 手技:静脈内 経路:Rp4開始45分前までにIV	IV		●															●												●	
3	生食 50mL 手技: 経路:インラインフィルター使用・前投薬投与	45分 DIV		●																●											●	
4	エムプリシティ( )mg+ 注射用水 40mL+ 生食 500mL 手技:静脈内 経路:1VをDW13mLで溶解(25mg/mL)	※上記参照 DIV		●																											●	
5	ヘパリンNaロックシリンジ 手技:静脈内 経路:終了後	IV		●																											●	
6	レブラミド( )mg 手技:内服 経路:3投1休	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															