化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	070	CODE	004015001070
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	DCd.s.c(①:4週目まで)		
申請年月日	令和3年8月16日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
カイプロリス(d1・d2)	DIV	20 mg/㎡
カイプロリス(d8以降)	DIV	56 mg/㎡
デカドロン	内服	20-40 mg/body
ダラキューロ	S.C	1800 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

※ ダラキューロ投与1－3時間前に前投薬(解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与

※ DEX:カイプロリスの30分前に服用

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デカドロン 20mg 手技:内服 経路:	内服		●	●						●	●						●	●					●	※d22:40mg/body					
2	5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●	●						●	●						●	●											
3	カイプロリス( )mg +注射用水 20mL+ 5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:20mg/㎡(①:d1.2)	30分 DIV		●	●																									
4	カイプロリス( )mg +注射用水 40mL+ 5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:56mg/㎡(d8以降)	30分 DIV									●	●						●	●											
5	5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●	●						●	●						●	●											
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:終了後	IV		●	●						●	●						●	●											
7	ダラキューロ 1800mg (30mLシリンジ) 手技:皮下 経路:前投服用確認/①(d1:モンテルカスト考慮)	3-5分 S.C		●							●							●						●						
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													

レジメ検討委員会