

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	073	CODE	004015001073
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	DCd.s.c(⑦以降:25週以降)		
申請年月日	令和3年8月16日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
カイプロリス	DIV	56 mg/m <sup>2</sup>
デカドロン	内服	20-40 mg/body
ダラキューロ	S.C	1800 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ ダラキューロ投与1-3時間前に前投薬(解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与

※ DEX:カイプロリスの30分前に服用

			投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 28 日)《 》クール																																		
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	デカドロン 20mg 手技:内服 経路:	内服		●	●						●	●						●	●						●								※d22:40mg/body				
2	5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●	●						●	●						●	●																		
3	カイプロリス( )mg +注射用水 40mL+ 5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:56mg/m <sup>2</sup>	30分 DIV		●	●						●	●						●	●																		
4	5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●	●						●	●						●	●																		
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:終了後	IV		●	●						●	●						●	●																		
6	ダラキューロ 1800mg 手技:皮下 経路:前投服用確認/30mLシリンジ	3-5分 S.C		●																																	
7	手技: 経路:																																				
8	手技: 経路:																																				
9	手技: 経路:																																				
10	手技: 経路:																																				