

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	074	CODE	004015001074
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	☆wDCd(①:4週目まで)		
申請年月日	令和3年8月16日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
カイプロリス(d1)	DIV	20 mg/m ²
カイプロリス(d8以降)	DIV	70 mg/m ²
デカドロン	内服	40 mg/body
ダラキューロ	S.C	1800 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ ダラキューロ投与1-3時間前に前投薬(解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デカドロン 40mg 手技:内服 経路:カイプロリスの30分前に服用	内服		●							●							●							●						
2	5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●							●							●							●						
3	カイプロリス()mg +注射用水 20mL+ 5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:20mg/m ² (day1)	30分 DIV		●																											
4	カイプロリス()mg +注射用水 60mL+ 5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:70mg/m ² (day8以降)	30分 DIV									●							●													
5	5%Glu 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●							●							●													
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:終了後	IV		●							●							●													
7	ダラキューロ 1800mg (30mLシリンジ) 手技:皮下 経路:前投確認/day1:モンテルカスト投与考慮	3-5分 S.C		●							●							●							●						
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														