# 化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙



| 領域 | 血液腫瘍 | ルート | リザーバー |
|---|---|---|---|
| 適応 | 【MM】多発性骨髄腫 | | |
| No(3桁) | 077 | CODE | 004015001077 |
| 診療科 | 内科 | 医師 | 伊東 |
| セット名称 | ☆wDCd(⑦以降:25週以降) | | |
| 申請年月日 | 令和3年8月16日 | | |
| 緊急 | ● | 通常 | |

| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
|---|---|---|
| カイプロリス | DIV | 70 mg/㎡ |
| デカドロン | 内服 | 40 mg/body |
| ダラキューロ | S.C | 1800 mg/body |
| | | |

| Aポート | Vポート | 皮下 | 確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| | ● | | | | |

※ ダラキューロ投与1－3時間前に前投薬(解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 28 日)《 》クール

| 投与順 | Rp | 投与時間 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デカドロン 40mg<br>手技:内服 経路:カイプロリスの30分前に服用 | 内服 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 2 | 5%Glu 50mL<br>手技:静脈内 経路: | 15分<br>DIV | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 3 | カイプロリス( )mg +注射用水 60mL+ 5%Glu 50mL<br>手技:静脈内 経路:70mg/㎡(day8以降) | 30分<br>DIV | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5%Glu 50mL<br>手技:静脈内 経路: | 15分<br>DIV | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ヘパリンNaロックシリンジ 1本<br>手技:静脈内 経路:終了後 | IV | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ダラキューロ 1800mg<br>手技:皮下 経路:前投確認/30mLシリンジ | 3-5分<br>S.C | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

レジメ検討委員会