化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No（3桁）	080	CODE	004015001080
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	SPd（1コース目）		
申請年月日	令和2年12月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ポマリスト	内服	4 mg/body
デキサート	DIV	33 mg/body
サークリサ	DIV	10 mg/kg

Aポート	Vポート	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

※ infusion reaction予防：本剤投与開始15～60分前に、本剤と併用するDEX、抗ヒスタミン剤、H2受容体拮抗薬、解熱鎮痛剤を投与

※2：内服は40mg（75歳以上は20mgに減量）

投与スケジュール：（　投　休）or（投与間隔　28　日）《 1 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デキサート 33mg（※2） ＋ 生食 50mL 手技：静脈内　経路：ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用/前投投与後	30分 DIV		●							●							●							●						
3	サークリサ（　　）mg ＋ 生食250mL 手技：静脈内　経路：トータル250mL	別紙参照 DIV		●							●							●							●						
4	生食 50mL 手技：静脈内　経路：	10分 DIV		●							●							●							●						
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内　経路：終了後			●							●							●							●						
6	ポマリスト 4 mg 手技：内服　経路：	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
7	手技：　経路：																														
8	手技：　経路：																														
9	手技：　経路：																														
10	手技：　経路：																														

レジメ検討委員会