

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	081	CODE	004015001081
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	SPd(2コース目)		
申請年月日	令和2年12月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ポマリスト	内服	4 mg/body
デキサート	DIV	33 mg/body
サークリサ	DIV	10 mg/kg

Aポート	Vポート	皮下	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ infusion reaction 予防: 本剤投与開始15~60分前に、本剤と併用するDEX、抗ヒスタミン剤、H2受容体拮抗薬、解熱鎮痛剤を投与

※2: 内服は40mg(75歳以上は20mgに減量)

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	デキサート 33 mg(※2) + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: インラインフィルター使用/前投投与後	30分 DIV		●																												
2	デカドロン 40mg 手技: 内服 経路:	内服																														
4	サークリサ()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: トータル250mL	別紙参照 DIV		●																												
5	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																												
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: 終了後	IV		●																												
7	ポマリスト 4 mg 手技: 内服 経路:	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															