

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	皮下
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	016	CODE	004015004016
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	DBd(④-⑧:24週目まで)		
申請年月日	令和3年8月16日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ベルケイド	皮下	1.3 mg/m <sup>2</sup>
デカドロン	内服	20 mg/body
ダラキューロ	皮下	1800 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認		
		●	医師	看護師	薬剤師

※ ダラキューロ投与1-3時間前に前投薬(副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与、必要に応じて投与後に副腎皮質ホルモンを投与

※ ロイコトリエン阻害薬:1サイクル目の1日目に任意で投与可

投与スケジュール: ( 1 投 2 休 ) or (投与間隔 21 日)《 5 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ベルケイド( )mg+生食20mL 手技:皮下 経路:	皮下		●																												
2	ダラキューロ 1800mg ( 15mL ) 手技:皮下 経路:前投確認/30mLシリンジ	3~5分 s.c		●																												
3	デカドロン 20mg 手技:内服 経路:	内服		●	●																											
4	手技: 経路:																															
5	手技: 経路:																															
6	手技: 経路:																															
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															