

## 化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【PBSCH】末梢血幹細胞採取前処置		
No(3桁)	003	CODE	004016001003
診療科	血液内科	医師	堤
セット名称	☆VTD-PACE		
申請年月日	平成25年5月28日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量	Aポート	Vポート	末梢	確認
ベルケイド	SC	1 mg/m <sup>2</sup>				医師
シスプラチニ	DIV	10 mg/m <sup>2</sup>				看護師
ドキソルビシン	DIV	10 mg/m <sup>2</sup>				薬剤師
エンドキサン	DIV	400 mg/m <sup>2</sup>				
エトポシド	DIV	40 mg/m <sup>2</sup>				
サレド	PO	200 mg/body				
デカドロン	PO	40 mg/body				

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数) 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:①ルート	24時間 CIV					●	●	●	●																				
2	アロキシ 1A 手技:静脈内 経路:	IV					●																							
3	ベルケイド( )mg + 生食( )mL 手技:皮下 経路:生食1.2mLで溶解する	皮下 SC	●				●				●		●																	
4	エトボシド( )mg + 生食500mL 手技:静脈内 経路:①ルート側管	24時間 CIV					●	●	●	●																				
5	シスプラチニ( )mg + ドキソルビシン( )mg + エンドキサン( )mg + 生食500mL 手技:静脈内 経路:②ルート 点滴バッグを遮光	24時間 CIV					●	●	●	●																				
6	サレド 200mg 手技:内服 経路:	内服 寝る前					●	●	●	●																				
7	デカドロン 40mg【 - - 】 手技:内服 経路:	内服 毎食後					●	●	●	●																				
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													