

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	001	CODE	004017001001
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★MCEC		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急	通常		●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サイメリン	DIV	200 mg/m ²
カルボプラチン	DIV	300 mg/m ²
エトポシド	DIV	500 mg/m ²
エンドキサン	DIV	50 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																										
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28														
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●	●																																			
2	サイメリン()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 遮光すること, 溶解後2時間以内に投与終了すること	1時間 DIV		●						●																																			
3	カルボプラチン()mg + 5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV			●	●	●	●																																					
4	エトポシド()mg 手技: 静脈内 経路: シリンジポンプで生食の側管より	6時間 DIV				●	●	●																																					
5	生食1000mL 手技: 静脈内 経路: エトポシドと同時に	6時間 DIV				●	●	●																																					
6	エンドキサン()mg + 生食500mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV								●	●																																		
7	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: CY開始0・4・8時間後	15分 DIV								●	●	●	●	エンドキサンの1日量の約40%																															
8	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●	●	●																																			
9	手技: 経路:																																												
10	手技: 経路:																																												