

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	005	CODE	004017001005
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★BU+HdL-PAM(70×2)		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ブスルフェクス	DIV	0.8*4回 mg/kg
アルケラン	DIV	70 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
2	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV		●	●	●																								
3	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV		●	●	●																								
4	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分	30分 DIV		●	●	●																								
5	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV		●	●	●																								
6	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV		●	●	●																								
7	アルケラン()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後1.5hr以内に投与終了する	1時間 DIV						●	●																					
8	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●																						
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													