

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	008	CODE	004017001008
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★BU+FLU(15mg/m ² ×2)		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ブスルフェクス	DIV	0.8×4回 mg/kg
フルダラ	DIV	15×2回 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																						
2	フルダラ()mg+注射用水+生食100mL 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																						
3	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV				●	●																								
4	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV				●	●																								
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																						
6	フルダラ()mg+注射用水+生食100mL 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																						
7	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV				●	●																								
8	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV				●	●																								
9	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●	●																						
10	手技: 経路:																														