

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	011	CODE	004017001011
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★BU+CY(60×2)		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ブスルフェクス	DIV	0.8×4回 mg/kg
エンドキサン	DIV	60 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																					
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																															
2	ブスルフェクス( )mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV		●	●	●	●																																	
3	ブスルフェクス( )mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV		●	●	●	●																																	
4	ブスルフェクス( )mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV		●	●	●	●																																	
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分	30分 DIV		●	●	●	●																																	
6	ブスルフェクス( )mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間 DIV		●	●	●	●																																	
7	エンドキサン( )mg + 生食500mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV						●	●																															
8	ウロミテキサン( )mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: CY開始0・4・8時間後	15分 DIV						●	●	●	1回量はエンドキサンの1日量の約40%																													
9	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●	●																															
10	手技: 経路:																																							