

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	018	CODE	004017001018
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★MEAM		
申請年月日	平成21年11月4日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サイメリン	DIV	300 mg/m <sup>2</sup>
エトポシド	DIV	100*2 mg/m <sup>2</sup>
シタラビン	DIV	200*2 mg/m <sup>2</sup>
アルケラン	DIV	140 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																					
2	サイメリン( )mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 遮光すること, 溶解後2時間以内に投与終了すること	1時間 DIV		●	●																									
3	エトポシド( )mg + 5%ブドウ糖500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV			●	●	●	●																						
4	シタラビン( )mg + 5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: 3に引き続き投与開始	1時間 DIV			●	●	●	●																						
5	エトポシド( )mg + 5%ブドウ糖500mL 手技: 静脈内 経路: 3の12時間後に投与開始	2時間 DIV			●	●	●	●																						
6	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●	●	●	●																						
7	シタラビン( )mg + 5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: 4の12時間後に投与開始	1時間 DIV			●	●	●	●																						
8	生食20mL 手技: 静脈内 経路:	IV							●																					
9	アルケラン( )mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後1.5時間以内に投与終了すること	2時間 DIV							●																					
10	生食20mL 手技: 静脈内 経路:	IV							●																					