

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/2頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	025	CODE	004017001025
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【治験③Haplo16 RIC】★BU+FLU+TBI-CY		
申請年月日	平成28年7月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量	Aポート	Vポート	末梢	確認
ブルフェクス	DIV	0.8 × 4回 mg/kg				医師
フルダラ	DIV	30 mg/m ²		●		看護師
TBI(全身放射線照射)		4 Gy				薬剤師
エンドキサン	DIV	40 mg/kg				

※G-CSF: 300μg/m²

※Tac: 0.02-0.03mg/kgで開始し、180日まで

※CPA: 標準体重 < 実体重 ≒ 標準体重 (IBW) × 125% の場合は標準体重を使用

※BUを1日1回投与で行うことは可とする

※ミコフェノール酸モフェチル: 1日3回(1回15mg/kg)、35日目まで

※TBIはDay-1を推奨するが、Day-6～Day0の輸注までの期間であれば可

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	ブルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で(4:00)	2時間 DIV					●	●																									
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 9:30	30分 DIV		●	●	●	●	●																									
3	ブルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で(10:00)	2時間 DIV				●	●																										
4	フルダラ()mg+注射用水+生食100mL 手技: 静脈内 経路: 12:00	30-60分 DIV		●	●	●	●	●	●																								
5	ブルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で(16:00)	2時間 DIV					●	●																									
6	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 21:30	30分 DIV					●	●																									
7	ブルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で(22:00)	2時間 DIV					●	●																									
8	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV					●	●	●																								
9	TBI(全身放射線照射) 4Gy 手技: 経路:									●																							
10	PBSCT(末梢血幹細胞移植) 手技: 経路:										●																						

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

2/2頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	025	CODE	004017001025
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【治験③Haplo16 RIC】★BU+FLU+TBI-CY		
申請年月日	平成28年7月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量	Aポート	Vポート	末梢	確認
ブスルフェクス	DIV	0.8 × 4回 mg/kg				医師
フルダラ	DIV	30 mg/m ²	●			看護師
TBI(全身放射線照射)		4 Gy				薬剤師
エンドキサン	DIV	40 mg/kg				

※G-CSF: 300μg/m²

※Tac: 0.02-0.03mg/kgで開始し、180日まで

※CPA: 標準体重 < 実体重 ≒ 標準体重 (IBW) × 125% の場合は標準体重を使用

※BUを1日1回投与で行うことは可とする

※ミコフェノール酸モフェチル: 1日3回(1回15mg/kg)、35日目まで

※TBIはDay-1を推奨するが、Day-6～Day0の輸注までの期間であれば可

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数) 《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 9:30	30分 DIV											●	●																	
12	エンドキサン()mg + 生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 10:00	2-3時間 DIV											●	●																	
13	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: エンドキサン投与開始時	30分 DIV											●	●																	
14	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: エンドキサン投与4時間後	30分 DIV											●	●																	
15	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: エンドキサン投与8時間後	30分 DIV											●	●																	
16	ソルデム3A 2000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV											●	●																	

※1回投与量はエンドキサン1日量の40%