

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	030	CODE	004017001030
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★HdVP16(900mg/m ² *1)+HdCY(60mg/kg*2)		
申請年月日	平成28年10月28日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	900 mg/m ²
エンドキサン	DIV	60 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																						
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●																																			
2	エトポシド()mg 手技: 静脈内 経路: シリンジポンプで生食の側管より	6時間 DIV		●																																					
3	生食1000mL 手技: 静脈内 経路: エトポシドと同時	6時間 DIV		●																																					
4	エンドキサン()mg + 生食500mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV			●	●																																			
5	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: CY開始0・4・8時間後	15分 DIV			●	●	●	●	1回量はエンドキサンの1日量の約40%																																
6	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●																																			
7	手技: 経路:																																								
8	手技: 経路:																																								
9	手技: 経路:																																								
10	手技: 経路:																																								