

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	035	CODE	004017001035
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【Haplo17 MAC①】★BU+FLU+TBI-CY		
申請年月日	平成29年9月4日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ブスルフェクス	DIV	0.8×4回 mg/kg
フルダラ	DIV	30 mg/m ²
TBI(全身放射線照射)		4 Gy
エンドキサン	DIV	50 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※G-CSF:300μ g/m²

※Tac:0.02-0.03mg/kgで開始し、90日以降減量・中止

※CPA:標準体重<実体重≤標準体重(IBW)×125%の場合は標準体重を使用

※BUを1日1回投与で行うことは可とする

※ミコフェノール酸モフェチル:1日3回(1回15mg/kg)、30日目以降減量

※TBIはDay-1を推奨するが、Day-6~Day0の輸注までの期間であれば可

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																																								
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												
1	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技:静脈内 経路:6時間間隔で(4:00)	2時間 DIV			●	●	●	●																																			
2	グラニセロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:9:30	30分 DIV		●	●	●	●	●																																			
3	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技:静脈内 経路:6時間間隔で(10:00)	2時間 DIV		●	●	●	●		※痙攣予防としてデパケン予防的に服用																																		
4	フルダラ()mg+注射用水+生食100mL 手技:静脈内 経路:12:00	30-60分 DIV		●	●	●	●	●																																			
5	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技:静脈内 経路:6時間間隔で(16:00)	2時間 DIV		●	●	●	●																																				
6	グラニセロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:21:30	30分 DIV		●	●	●	●																																				
7	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技:静脈内 経路:6時間間隔で(22:00)	2時間 DIV		●	●	●	●																																				
8	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●																																			
9	TBI(全身放射線照射) 4Gy 手技: 経路:										●																																
10	PBSCT(末梢血幹細胞移植) 手技: 経路:											●																															

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	035	CODE	004017001035
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【Haplo17 MAC①】★BU+FLU+TBI-CY		
申請年月日	平成29年9月4日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ブスルフェクス	DIV	0.8×4回 mg/kg
フルダラ	DIV	30 mg/m ²
TBI(全身放射線照射)		4 Gy
エンドキサン	DIV	50 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※G-CSF:300μ g/m²

※Tac:0.02-0.03mg/kgで開始し、90日以降減量・中止

※CPA:標準体重<実体重≦標準体重(IBW)×125%の場合は標準体重を使用

※BUを1日1回投与で行うことは可とする

※ミコフェノール酸モフェチル:1日3回(1回15mg/kg)、30日目以降減量

※TBIはDay-1を推奨するが、Day-6~Day0の輸注までの期間であれば可

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
11	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:9:30	30分 DIV											●	●																		
12	エンドキサン()mg + 生食 500mL 手技:静脈内 経路:10:00	2-3時間 DIV											●	●																		
13	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン投与開始時	30分 DIV											●	●	※1回投与量はエンドキサン1日量の40%																	
14	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン投与4時間後	30分 DIV											●	●																		
15	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン投与8時間後	30分 DIV											●	●																		
16	ソルデム3A 2000mL 手技:静脈内 経路:	24時間 CIV											●	●																		