

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	038	CODE	004017001038
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【Haplo17 MAC】★移植後CY50mg/kg(day3・4)		
申請年月日	平成29年9月4日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	50 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※G-CSF:300μ g/m²

※Tac:0.02-0.03mg/kgで開始し、90日より減量・中止

※ミコフェノール酸モフェチル:1日3回(1回15mg/kg)、30日目より減量・中止

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:9:30	30分 DIV		●	●																										
2	エンドキサン()mg + 生食 500mL 手技:静脈内 経路:10:00	2-3時間 DIV		●	●																										
3	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン投与開始時	30分 DIV		●	●																										
4	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン投与4時間後	30分 DIV		●	●																										
5	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:エンドキサン投与8時間後	30分 DIV		●	●																										
6	ソルデム3A 2000mL 手技:静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●																										
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														