

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	039	CODE	004017001039
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【Haplo17 RIC】★移植後CY40mg/kg(day3・4)		
申請年月日	平成29年9月4日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	40 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※G-CSF: 300μ g/m<sup>2</sup>

※Tac: 0.02-0.03mg/kgで開始し、90日より減量・中止

※CPA: 標準体重<実体重≤標準体重(IBW)×125%の場合は標準体重を使用

※ミコフェノール酸モフェシル: 1日3回(1回15mg/kg)、30日目より減量・中止

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 9:30	30分 DIV		●	●																											
2	エンドキサン( )mg + 生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 10:00	2-3時間 DIV		●	●																											
3	ウロミテキサン( )mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: エンドキサン投与開始時	30分 DIV		●	●																											
4	ウロミテキサン( )mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: エンドキサン投与4時間後	30分 DIV		●	●																											
5	ウロミテキサン( )mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: エンドキサン投与8時間後	30分 DIV		●	●																											
6	ソルデム3A 2000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●																											
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															