

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	051	CODE	004017001051
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	★BU(0.8mg*4) + TT		
申請年月日	令和3年7月8日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ブスルフェクス	DIV	0.8 * 4 mg/kg
リサイオ	DIV	5 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ ブスルフェクス: けいれん予防に抗アレルギー薬の予防投与

※ リサイオ: 0.5-4.4mg/mLの希釈濃度において、室温26時間まで安定

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ブスルフェクス ()mg + 5%ブドウ糖液 100mL 手技: 静脈内 経路: 4:00(6時間間隔で)	2時間 DIV			●	●	●	●																							
2	グラニセトンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 9:30	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																						
3	ブスルフェクス ()mg + 5%ブドウ糖液 100mL 手技: 静脈内 経路: 10:00(6時間間隔で)	2時間 DIV		●	●	●	●																								
4	ブスルフェクス ()mg + 5%ブドウ糖液 100mL 手技: 静脈内 経路: 16:00(6時間間隔で)	2時間 DIV		●	●	●	●																								
5	グラニセトンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 21:30	30分 DIV		●	●	●	●																								
6	ブスルフェクス ()mg + 5%ブドウ糖液 100mL 手技: 静脈内 経路: 22:00(6時間間隔で)	2時間 DIV		●	●	●	●																								
7	リサイオ ()mg + 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 【インラインフィルター使用】/10:00	2時間 DIV							●	●																					
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV								●																					
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														