

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	泌尿器がん	ルート	リザーバー
適応	前立腺がん		
No(3桁)	002	CODE	005002001002
診療科	泌尿器科	医師	西村
セット名称	Cabazitaxel		
申請年月日	平成26年10月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ジェブタナ	DIV	25 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 希釈後濃度0.1～0.26mg/mL

※ 投与量25.4mg/body以下の場合は生食100mLに希釈する

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール																															
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	プレドニン 10mg(朝 錠-昼 錠-夕 錠) 手技:内服 経路:	PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
2	デキサート 6.6mg+ファモチジン 20mg 手技:静脈内 経路:インラインフィルター使用	IV		●																											
3	グラニセトロンバッグ 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
4	生食 250mL+ジェブタナ()mg 手技:静脈内 経路:希釈後8時間以内に投与終了する事	1時間 DIV		●																											
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																											
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														