## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	泌尿器がん	ルート	リザーバー								
適応	尿路上皮がん										
No(3桁)	005	CODE	005003001005								
診療科	泌尿器科	医師	西村								
セット名称	M-VEC【イメンド併用】										
申請年月日	平成23年8月2日										
緊急	•	通常									

抗癌剤名称	手技	標準	<b>性投</b> 与量
メソトレキセート	DIV	30	mg/m <sup>²</sup>
エクザール	DIV	3	mg/m <sup>²</sup>
エピルビシン	DIV	30	mg/ <b>m</b> i
シスプラチン	DIV	70	mg/m²

Aポート Vポート	末梢		確認									
		医師	看護師	薬剤師								

			抖	设与ス	ケジ	ジュー	ール	:	(		投	:		休	)	or	(持	<b>设与</b>	間隔	Ā	2	8	日)(	<b>«</b>	<b>》</b>	クー	-ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1 2	3	4	5	6	7 8	8 9	10	11	12	13	14	15 1	6 1	7 18	19	20	21	22	23 2	4 25	5 26	27	28
1	ソルデム3A 1000mL	6時間																									
_ '	手技:静脈内 経路:メインルート	DIV																									
2	生食 50mL																										
	手技: 経路:プライミング用	IV																									
3	生食 100mL+メソトレキセート( )mg	30分																									
L	手技:静脈内 経路:側管	DIV																									
4	ソルデム3A 1000mL+ラクテック 1000mL	24時間																									
	手技:静脈内 経路:メインルート	CIV																									
5	生食 100mL+アロキシ 0.75mg+デキサート 9.9mg	30分	Ш	ı.																							
	手技:静脈内 経路:側管【イメンド併用】	DIV																									
6	生食 50mL+エクザール( )mg	15分	Ш																								
	手技:静脈内 経路:側管	DIV																									
7	生食 50mL+エピルビシン( )mg	15分	Ш																								
	手技:静脈内 経路:側管	DIV																									
8	マンニットールS 300mL	1時間	Ш																								
	手技:静脈内 経路:側管	DIV																									
9	生食 500mL+シスプラチン( )mg	2時間													- [												
	手技:静脈内 経路:側管	DIV																									
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1筒																										
	手技: 経路:	IV																									