

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	泌尿器がん	ルート	リザーバー
適応	精巣腫瘍		
No(3桁)	002	CODE	005004001002
診療科	泌尿器科	医師	西村
セット名称	☆TIN【イマド併用】		
申請年月日	平成23年5月19日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
パクリタキセル	DIV	200 mg/m ²
イホマイド	DIV	2000 mg/m ²
アクブラ	DIV	100 mg/m ²
ウロミテキサン	DIV	400 mg/m ² /回

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ウロミテキサンはイホマイド1日量の約2割を1回量として投与

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ラクテック 1000mL + ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	24時間 DIV		●	●	●	●	●																							
2	デキサート13.2mg+グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 側管より	15分 DIV		●	●	●																									
3	生食 50mL + ラニチジン 1A 手技: 静脈内 経路: 側管より	15分 DIV		●																											
4	生食 500mL + パクリタキセル()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	3時間 DIV		●																											
5	生食 50mL + ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始前に	15分 DIV		●	●	●																									
6	生食 500mL + イホマイド()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より、溶解後6時間以内に投与終了すること	4時間 DIV		●	●	●																									
7	生食 50mL + ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始4時間後に	15分 DIV		●	●	●																									
8	マンニトール 300mL 手技: 静脈内 経路: 側管より	1時間 DIV			●																										
9	生食 500mL + アクブラ()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV			●																										
10	生食 50mL + ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始8時間後に	15分 DIV		●	●	●																									
11	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:								●																						