

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	泌尿器がん	ルート	リザーバー
適応	精巣腫瘍		
No(3桁)	004	CODE	005004001004
診療科	泌尿器科	医師	西村
セット名称	★VeIP【イメド併用】		
申請年月日	平成23年5月19日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シスプラチン	DIV	20 mg/m ²
エクザール	DIV	0.11 mg/kg
イホマイド	DIV	1200 mg/m ²
ウロミテキサン	DIV	240 mg/m ² /回

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 21 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ソルデム3A 1000mL + ラクテック 1000mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	15時間 DIV		●	●	●	●	●	●																					
2	グラニセトロンパック 50mL + デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: 側管	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
3	生食 50mL + エクザール()mg 手技: 静脈内 経路: 側管	30分 DIV		●	●																									
4	生食 50mL + ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始前に	15分 DIV		●	●	●	●	●																						
5	生食 500mL + イホマイド()mg 手技: 静脈内 経路: 側管、溶解後6時間以内に投与終了すること	4時間 DIV		●	●	●	●	●																						
6	生食 50mL + ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始4時間後に	15分 DIV		●	●	●	●	●																						
7	マンニトール 300mL 手技: 静脈内 経路: 側管	1時間 DIV		●	●	●	●	●																						
8	生食 500mL + シスプラチン()mg 手技: 静脈内 経路: 側管	2時間 DIV		●	●	●	●	●																						
9	生食 50mL + ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始8時間後に	15分 DIV		●	●	●	●	●																						
10	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:								●																					