

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	泌尿器がん	ルート	末梢静脈
適応	その他		
No(3桁)	002	CODE	005006002002
診療科	泌尿器科	医師	西村
セット名称	MBP【イメンド併用】(末梢)		
申請年月日	平成30年3月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	200 mg/m ²
ブレオ	DIV	10 mg/m ²
シスプラチン	DIV	20 mg/m ²
ロイコボリン	IV	25 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
		●	医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 28 日)《 》クール																																
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	グラニセトロンバック 50mL + デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:【イメンド併用】・側管	30分 DIV		●														●																	
2	メソトレキセート()mg + 生食 250mL 手技: 経路:側管	500mL/hr DIV		●														●																	
3	ダイアモックス500mg + 生食 100mL 手技: 静脈内 経路:側管	60分 DIV		●														●																	
4	ソルデム3A 500mL + メイロン8.4% 20mL 手技: 静脈内 経路:側管	60分 DIV		●														●																	
5	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路:側管	60分 DIV		●														●																	
6	ソルデム3A 500mL+ファモチジン20mg+ネオファーゲン20mL 手技: 静脈内 経路:メインルート	5時間 DIV		●														●																	
7	ソルデム3A 500mL + メイロン8.4% 20mL 手技: 静脈内 経路:メインルート	5時間 DIV		●														●																	
8	ソルデム3A 500mL + メイロン8.4% 20mL 手技: 静脈内 経路:メインルート	5時間 DIV		●														●																	
9	ロイコボリン 25mg 手技: 静脈内 経路: MTX開始24hr後より6時間毎に12回	IV			3 回	4 回	4 回	1 回																											

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	泌尿器がん	ルート	末梢静脈
適応	その他		
No(3桁)	002	CODE	005006002002
診療科	泌尿器科	医師	西村
セット名称	MBP【イメンド併用】(末梢)		
申請年月日	平成30年3月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	200 mg/m ²
ブレオ	DIV	10 mg/m ²
シスプラチン	DIV	20 mg/m ²
ロイコポリン	IV	25 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
		●	医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 28 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	グラニセトロンバック 50mL + デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: 側管	30分 DIV			●	●	●	●																							
11	ブレオ()mg + 生食 100mL 手技: 静脈内 経路: 側管	30分 DIV			●	●	●	●																							
12	マンニトールS 300mL 手技: 静脈内 経路: 側管	500mL/hr DIV			●	●	●	●																							
13	シスプラチン()mg + 生食 250mL 手技: 経路: 側管	3時間 DIV			●	●	●	●																							
14	ソルデム3A 500mL + ダイアモックス250mg 手技: 経路: 側管	3時間 DIV			●	●	●	●																							
15	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路: 側管	3時間 DIV			●	●	●	●																							
16	ソルデム3A 500mL+ファモチジン20mg+ネオファーゲン20mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	8時間 DIV			●	●	●	●	●	●																					
17	ソルデム3A 500mL + メイロン8.4% 20mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	8時間 DIV			●	●	●	●	●	●																					
18	ソルデム3A 500mL + メイロン8.4% 20mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	8時間 DIV			●	●	●	●	●	●																					
19	生食 20mL 手技: 静脈内 経路: 終了時	IV								●																					