

# 化 学 療 法 レ ジ メン セ ット 登 録 用 紙

1/2頁

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮体がん		
No(3桁)	061	CODE	007003001061
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	EMA-CO		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	100 mg/m <sup>2</sup>
コスメゲン	IV	0.5 mg/body
メソトレキセート	DIV	300 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	600 mg/m <sup>2</sup>
オンコビン(最大2mg)	IV	1 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or 投与間隔 14 日)《 》クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●	●						●						(●)	(●)							●					
2	生食 500mL+エトポシド( )mg 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV		●	●													(●)	(●)											
3	生食 500mL+メイロン 20mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV		●	●													(●)	(●)											
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●	●													(●)	(●)											
5	生食 20mL+注射用水 20mL+コスメゲン( )mg 手技:静脈内 経路:側管 1.1mLで溶解後1.0mL使用	IV		●	●													(●)	(●)											
6	生食 20mL 手技:静脈内 経路:フラッシュ用	IV		●														(●)												
7	生食 1000mL+メソトレキセート( )mg 手技:静脈内 経路:	12時間 DIV		●														(●)												
8	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:側管	2時間 DIV		●														(●)												
9	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:側管	2時間 DIV		●														(●)												
10	ロイコボリン 15mg 手技:筋注 経路:MTX開始24時間後から	6時間毎 4回			●	●												(●)	(●)											

# 化 学 療 法 レ ジ メン セ ット 登 錄 用 紙

2/2頁

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮体がん		
No(3桁)	061	CODE	007003001061
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	EMA-CO		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	100 mg/m <sup>2</sup>
コスメゲン	IV	0.5 mg/body
メソトレキセート	DIV	300 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	600 mg/m <sup>2</sup>
オンコビン(最大2mg)	IV	1 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or 投与間隔 14 日)《 》クール																										
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV								●															(●)				
12	生食 100mL+エンドキサン( )mg 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	30分 DIV								●															(●)				
13	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV								●															(●)				
14	生食 10mL+オンコビン( )mg 手技:静脈内 経路:	IV								●															(●)				
15	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV								●															(●)				
16	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●	●					●								(●)	(●)						(●)				