

## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮体がん		
No(3桁)	062	CODE	007003001062
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	★MEA		
申請年月日	平成28年3月2日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	100 mg/body
コスメゲン	IV	0.5 mg/body
メソトレキセート	IV	150 mg/body
	DIV	300 mg/body
ロイコボリン	IM	10 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

		投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 》クール																													
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																			(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
2	ソリューゲンF 500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●	●	●	●	●																		(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	
3	生食 250mL+エトポシド( )mg 手技: 静脈内 経路:側管	1時間 DIV		●	●	●	●	●																		(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	
4	生食 20mL+メソトレキセート( )mg 手技: 静脈内 経路:緩徐に	IV		●																					(●)						
5	ラクテック 500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●																						(●)					
6	生食 20mL+注射用水 20mL+コスメゲン( )mg 手技: 静脈内 経路:遮光 ラクテックと同時に 1.1mLで溶解後1.0mL使用	IV		●	●	●	●	●																		(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	
7	生食 500mL+メソトレキセート( )mg 手技: 静脈内 経路:	4時間 DIV		●																						(●)					
8	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路:	4時間 DIV		●																						(●)					
9	ロイコボリン 10mg 手技: 筋注 経路:MTX開始24時間後から	6時間毎 4回				●	●																				(●)	(●)			
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●																		(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	