

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	頭頸部がん	ルート	リザーバー
適応	頭頸部がん		
No(3桁)	031	CODE	009001001031
診療科	耳鼻咽喉科	医師	山下(恵)
セット名称	Pembro+CBDCA+5-FU		
申請年月日	令和2年5月18日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
カルボプラチン	DIV	5 AUC
フルオロウラシル	DIV	1000 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 6 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/インラインフィルター使用	IV		●																											
2	生食 100mL+キイトルーダ 200mg 手技: 静脈内 経路: 希釈後6時間以内に投与終了	30分 DIV		●																											
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
4	生食 100mL+プロイメンド 1V 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
5	生食 100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
6	生食 100mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●	●	●																								
7	生食 250mL+カルボプラチン( )mg 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●																											
8	ソルデム3A 500mL+フルオロウラシル( )mg 手技: 静脈内 経路:	24時間 DIV		●	●	●	●																								
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV						●																							
10	手技: 経路:																														