

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	悪性軟部腫瘍	ルート	リザーバー
適応	脂肪肉腫		
No(3桁)	001	CODE	011001001001
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	CYVADIC【イムド併用】		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	500 mg/m ²
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.5 mg/m ²
ドキシソルビシン	DIV	50 mg/m ²
ダカルバジン	DIV	250 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 21~28日) 《 》 クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバッグ 50mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路:【イムド併用】	30分 DIV		●																											
2	グラニセトロンバッグ 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●	●	●	●																							
3	生食250mL+エンドキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終	3時間 DIV			●																										
4	生食 50mL+オンコビン()mg 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
5	生食 50mL+ドキシソルビシン()mg 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
6	ダカルバジン()mg + 注射用水 + 生食500mL 手技: 静脈内 経路:	3時間 DIV		●	●	●	●	●																							
7	グラニセトロンバッグ 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																							
8	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●																							
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														