

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	悪性軟部腫瘍	ルート	リザーバー
適応	悪性軟部腫瘍		
No(3桁)	002	CODE	011001001002
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	IFM+ADM		
申請年月日	平成21年9月11日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ドキソルビシン	DIV	30 mg/m ²
イホマイド	DIV	2000 mg/m ²
ウロミテキサン	DIV	400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバッグ 50mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
2	ドキソルビシン()mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●	●																									
3	イホマイド()mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了すること	4時間 DIV		●	●	●	●	●																						
4	ウロミテキサン+生食100mL 手技: 経路: イホマイド投与時	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
5	ウロミテキサン+生食100mL 手技: 経路: イホマイド投与4時間後	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
6	ウロミテキサン+生食100mL 手技: 経路: イホマイド投与8時間後	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
7	ソルデム3A 1000mL 手技: 経路:	24時間 DIV		●	●	●	●	●																						
8	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV						●																						
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													